



Fichas

FLORA Y FAUNA

Región de Magallanes y
Antártica Chilena





FLORA: árboles y arbustos

COIGÜE DE MAGALLANES (*Nothofagus betuloides*)


Clase Dicotyledoneae. Sub-clase Hamamelidae. Orden Fagales. Familia Fagaceae.

Tamaño: Hasta 25 metros de altura.

Características: Árbol siempreverde, de corteza grisácea con grietas longitudinales irregulares poco profundas. Hojas perennes, gruesas, aserradas, de 1 a 2,5 cm. Copa generalmente frondosa y redondeada.

Hábitat: Lugares húmedos. Forma bosques puros o mixtos con lenga (*Nothofagus pumilio*).

Distribución: Desde la región de los Ríos hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

Rafael Contreras

LENGA (*Nothofagus pumilio*)

Clase Dicotyledoneae. Sub-clase Hamamelidae. Orden Fagales. Familia Fagaceae.

Tamaño: Hasta 30 metros de altura.

Características: Árbol caducifolio (pierde hojas en otoño), de un tronco de hasta 1,5 metros de diámetro, corteza gris oscura con grietas longitudinales. La hoja presenta dos lóbulos por nervadura.

Hábitat: Suelos profundos y semi profundos, bien desarrollados o con buen drenaje. Es dominante o codominante en bosques deciduos. En áreas desfavorables, crece como pequeño arbusto.

Distribución: Desde la región del Maule a Magallanes y Antártica Chilena; desde el nivel del mar hasta el límite altitudinal arbóreo.



CONAF

José González

ÑIRRE (*Nothofagus antarctica*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Hamamelidae. Orden Fagales. Familia Fagaceae.

Tamaño: Hasta 20 metros de altura.

Características: Árbol caducifolio, con tronco tortuoso de hasta 60 cm de diámetro. La hoja es irregular y presenta una resina que la vuelve muy aromática.

Hábitat: Suelos profundos y semi profundos, de bajas temperaturas y fuertes vientos, generalmente se ubica en el límite altitudinal vegetal. A veces forma bosquetes, se presenta como arbustos aislados o acompaña bosques deciduos de lenga (*Nothofagus pumilio*).

Distribución: Desde la región del Maule a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

CIPRÉS DE LAS GÜAITECAS (*Pilgerodendron uviferum*)

Clase Pinopsida. Orden Pinales. Familia Cupressaceae.

Tamaño: Hasta 20 metros de altura.

Características: Árbol conífero siempreverde. Tronco de hasta 40 cm de diámetro, de corteza rojiza. Presenta ramas ascendentes, hojas ovaladas de 2 a 3 mm de largo y conos globosos pardo oscuros, de 8 a 10 mm de largo. La madera es muy resistente a la putrefacción, por lo que se utiliza en la construcción de embarcaciones y postes.

Hábitat: Turberas, pantanos o suelos pedregosos. Generalmente forma manchas puras desde el nivel del mar a los 600 m.s.n.m.

Distribución: Desde la región de los Ríos hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

CANELO (*Drimys winteri*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Magnolidae. Orden Magnoliales. Familia Winteraceae.

Tamaño: Hasta 30 metros de altura.

Características: Árbol de tronco recto y cilíndrico, corteza de color gris. Hojas alternas de borde entero, oblongas o lanceoladas; al morderlas, se siente un sabor picante. Flores en umbelas, dispuestas de 4 a 6 solitarias, con pétalos blancos. El fruto es una baya globosa de 1 cm de longitud, de color negruzco o blanquecino con manchas negras; semillas negras de 2 a 3 mm de largo.

Hábitat: Suelos profundos y sombríos del bosque; laderas de cerros y valles.

Distribución: Desde la región de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena.

CONAF



Cortés de CEQUA

NOTRO O CIRUELILLO (*Embothrium coccineum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Proteales. Familia Potraceae.

Tamaño: Entre 3 y 15 metros de altura.

Características: Árbol o arbusto siempreverde de corteza gris oscura. Flores de color rojo en primavera, dispuestas en inflorescencias corimbosas.

Hábitat: Suelos delgados; laderas de cerros, márgenes y claros de bosques.

Distribución: Desde la región del Maule a Magallanes y Antártica Chilena.



Mauricio Ruiz

LEÑADURA (*Maytenus magellanica*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Celastrales. Familia Celastraceae.

Tamaño: Hasta 4 metros de altura.

Características: Arbusto o árbol perenne. Ramas gruesas, hojas alternas gruesas y coriáceas, de ápice y base atenuadas, con bordes irregulares aserrados. Flores con 5 pétalos color conchovino. Su fruto es una cápsula que contiene dos valvas con una o dos semillas.

Hábitat: Suelos delgados y arenosos; matorral y bosque.

Distribución: Desde la región del Bío Bío hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

ROMERILLO (*Chiliotrichum diffusum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Asteridae. Orden Asterales. Familia Asteraceae.

Tamaño: Hasta 1,2 metros de altura.

Características: Arbusto perenne, densamente ramificado, con hojas anchas verde grisáceas alternas, flores blancas y centrales amarillas (de noviembre a enero).

Hábitat: Suelos delgados y profundos; en áreas planas y laderas de cerros; en estepa y claros de bosque.

Distribución: Región de Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

Marcos Aguilar

CALAFATE (*Berberis microphylla*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Magnolidae. Orden Ranunculales. Familia Berberidaceae.

Tamaño: Hasta 3 metros de altura.

Características: Arbusto que presenta espinas en grupo de 3, de hasta 3 cm de largo, en cada grupo de hojas. Tiene un fruto comestible de color azul oscuro, de 7 a 11 mm de diámetro que contiene en su interior 6 a 10 semillas negras. Flores solitarias de color amarillo.

Hábitat: Suelos húmedos y secos; en la estepa y matorrales; en claros y márgenes de bosque.

Distribución: Desde la Región de O'Higgins hasta Magallanes y Antártica Chilena.

CONAF



Jaime Rodríguez

Carlos Flores

MICHAY (*Berberis ilicifolia*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Magnolidae. Orden Ranunculales. Familia Berberidaceae.

Tamaño: Entre 1,5 y 3 metros de altura.

Características: Arbusto perenne. A diferencia de otras especies de *Berberis*, presenta espinas en las hojas. Follaje simple, hojas oblongo elípticas; floración anaranjada.

Hábitat: Suelos semiprofundos, profundos, húmedos y sombríos; en bordes de río y sotobosque de *Nothofagus* sp. y canelo.

Distribución: Regiones de Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.

CONAF



Francisco Gascoigne

CHAURA (*Gaultheria mucronata*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Dillenidae. Orden Ericales. Familia Ericaceae.

Tamaño: Entre 40 y 120 cm de altura.

Características: Arbustos perenne, de ramas robustas; hojas alternas, de borde dentado con ápice agudo. Flores de color blanco. Su fruto es una baya de 6 a 9 mm de diámetro, casi globosa, de color blanco a fucsia cuando está madura.

Hábitat: Suelos delgados y profundos; secos y húmedos; arenosos; matorral y bosques abiertos.

Distribución: Desde la región del Bío Bío hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

MURTILLA (*Empetrum rubrum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Dillenidae. Orden Ericales. Familia Empetraceae.

Tamaño: Entre 25 y 40 cm de altura.

Características: Subarbusto siempreverde, crece en forma de disco adherido al suelo. Hojas muy densas, con cierta flexibilidad verde rojiza. Flores muy pequeñas. Fruto rojo-fucsia, de forma globosa, comestible.

Hábitat: Suelos delgados y profundos, arenosos, rocosos, secos y húmedo; pantanos y turbas; márgenes y claros de matorrales y bosques.

Distribución: Desde la región del Maule hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CHILCO (*Fuchsia magellanica*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Mirtales. Familia Onagraceae.

Tamaño: Entre 1 y 3 metros de altura.

Características: Arbusto siempreverde, con ramas delgadas, largas y frágiles, hojas dentadas. Flores solitarias colgantes de sépalos rojos fucsia y 4 pétalos morados.

Hábitat: Suelos profundos y húmedos; bordes de riachuelos y áreas degradadas de bosques.

Distribución: Desde la región del Maule hasta Magallanes y Antártica Chilena.



José González

FRUTILLA DE MAGALLANES (*Rubus geoides*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Rosales. Familia Rosaceae.

Tamaño: Entre 1 y 5 cm de altura.

Características: Planta perenne y rastrera, con flores blancas o rosadas de 5 pétalos. El fruto es de color rojo y comestible, que crece semi enterrado y cubierto por las pequeñas hojas trifoliadas, con márgenes serrados. Resistente a bajas temperaturas y a la nieve.

Hábitat: Claros del bosque o lugares soleados desde el nivel del mar hasta el límite altitudinal de la vegetación.

Distribución: Desde la región del Bío Bío a Magallanes y Antártica Chilena.



Francisco Gascoigne

Marcelo Aguilar

SIETE CAMISAS (*Escallonia virgata*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Rosales. Familia Saxifragaceae.

Tamaño: Entre 1,5 y 2 metros de altura.

Características: Arbusto que presenta ramas delgadas casi terminadas en espina. Flores solitarias en las axilas de las hojas, de color blanco o rosado pálido.

Hábitat: Bosques de Nothofagus, suelos húmedos y profundos; áreas planas y algunas laderas.

Distribución: Desde la región de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

SIETE CAMISAS COLORADO (*Escallonia rubra*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Rosales. Familia Saxifragaceae.

Tamaño: Hasta 5 metros de altura.

Características: Arbusto siempreverde, de hojas simples, alternas con márgenes dentados, color verde oscuro. A principios de verano, presenta flores color fucsia o rojo, de 1,2 a 2 cm de longitud, dispuestas en racimos terminales compuestos entre 7 y 30 unidades. Es la principal especie de matorral mesófito (suelos más húmedos).

Hábitat: Laderas rocosas, húmedas y orillas de cursos de agua.

Distribución: Desde la región de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena.



Vicen Alvarado

ZARZAPARRILLA (*Ribes magallanicum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Rosales. Familia Saxifragaceae.

Tamaño: Hasta 3 m de altura.

Características: Arbusto decíduo de hojas alternas pecioladas de 3 a 5 cm de largo. Los pecíolos y hojas son vellosos, de envés blanquecino. Flores amarillo cobrizo de 3 mm de diámetro pediceladas, reunidas en racimos con colgantes. El fruto es una baya negra globosa de 0,6 cm de diámetro, con semillas de color café a veces violáceas. Florece de septiembre a noviembre y fructifican de noviembre a enero.

Hábitat: Suelos profundos; claros de bosques, matorrales.

Distribución: Desde la región de los Ríos a Magallanes y Antártica Chilena.



Francisco Gascogne

CALAFATE ENANO (*Berberis empetrifolia*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Magnolidae. Orden Ranunculales. Familia Berberidaceae.

Tamaño: Entre 15 y 45 cm de altura.

Características: Arbusto rastrero, espinoso y pequeño. Hojas carnosas con 3 espinas en la base. Flores solitaria de 3 a 5 mm de diámetro, de color amarillo. Su fruto es una baya subglobosa de color azul oscuro que contiene de 3 a 7 semillas en su interior.

Hábitat: Suelos muy delgados, arenosos y rocosos; matorral abierto.

Distribución: Desde la región de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena.



Jaime Rodríguez

Jaime Rodríguez

MATA NEGRA (*Junellia tridens*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Asteridae. Orden Lamiales. Familia Verbenaceae.

Tamaño: Entre 1 y 1,5 m de altura.

Características: Arbusto perenne de color verde a negruzco, de forma hemisférica. Ramas rodeadas de hojas diminutas. Presenta una flor aromática de color de color blanquecino violáceo a rosado y se agrupan en inflorescencias terminaciones.

Hábitat: Áreas de matorral o formando grandes agrupaciones en zonas áridas de la estepa.
Distribución: Región de Magallanes y Antártica Chilena.

**MATA BARROSA** (*Mulinum spinosum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Apiales. Familia Apiaceae.

Tamaño: Entre 25 y 80 cm de altura.

Características: Arbusto perenne que forma un cojín redondo ramoso y espinoso. Sus hojas se dividen en tres y son altamente resinosas. Flor amarilla de 5 pétalos. Es la principal especie del matorral xerófito (ambientes de poca agua).

Hábitat: Suelos delgados; matorral xerófito y disperso en algunas áreas de la estepa patagónica.

Distribución: Desde la región de Coquimbo hasta Magallanes y Antártica Chilena.



NENEO MACHO (*Anarthrophyllum desideratum*)

Clase Dicotiledoneae. Sub-clase Rosidae. Orden Fabales. Familia Fabaceae.

Tamaño: Hasta 70 cm de altura.

Características: Arbusto perenne, de una forma hemisférica acojinada. Follaje verde grisáceo y denso. Presenta flores solitarias, apicales rojas o naranjas, entre octubre y diciembre.

Hábitat: Suelos delgados, arenosos y rocosos. Crece como matorrales dispersos en áreas esteparias.

Distribución: Región de Magallanes y Antártica Chilena.



FAUNA: mamíferos

Aturo Rosas

GUANACO (*Lama guanicoe*)

Orden Artiodactyla.

Tamaño: Altura de la cruz (lomo): hembra 192 cm, macho 188 cm.

Características: Camélido de cabeza alargada, piernas y cuello largo. Pelaje largo y suave. Coloración general café rojizo, partes inferiores blanquecinas y cara gris oscura.

Alimentación: Pastos, arbustos y brotes de lenga (ramoneo). También hongos y líquenes.

Hábitat: Vegas de la estepa y bosques, en el área de Tierra del Fuego.

Reproducción: Una vez al año, entre noviembre y febrero. El período de gestación dura 11 meses y tiene una sola cría al año que nace en verano, llamada chulengo.

Distribución: Desde la región de Arica y Parinacota hasta Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

HUEMUL (*Hippocamelus bisulcus*)

Orden Artiodactyla.

Tamaño: 85 cm a la altura de la cruz.

Características: Ciervo de mediano tamaño, robusto y de extremidades relativamente cortas. Se observa en grupos compuestos por un macho, una hembra y su cría. El macho posee un par de astas, que son reemplazadas anualmente.

Alimentación: Hierbas, arbustos (zarzaparrilla, chilco, etc.) y brotes de árboles (lenga, notro, etc.).

Hábitat: Área matorral periglacial y bosques.

Reproducción: A fines de primavera. El período de gestación dura entre 6 y 7 meses y tiene una sola cría llamada cervatillo.

Distribución: Regiones de Bío Bío, Los Lagos y Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

ZORRO CHILLA O GRIS (*Lycalopex griseus*)

Orden Carnívora.

Tamaño: 80 a 90 cm de largo, incluida la cola.

Características: Coloración general café, grisácea en el dorso y flancos; patas café pálido. Hocico afinado, orejas triangulares y grandes. Caninos largos y prominentes.

Alimentación: Aves, lagartijas, roedores, insectos, larvas, liebres y algunos frutos silvestres.

Hábitat: Estepa y matorral.

Reproducción: En primavera, tiene hasta 6 crías.

Distribución: En todo Chile hasta Tierra del Fuego.

**ZORRO ROJO O CULPEO** (*Lycalopex culpaeus*)

Orden Carnívora.

Tamaño: De 80 a 120 cm de largo, incluida la cola.

Características: Pelaje largo y denso. En la parte superior de la cabeza, la coloración puede ser oscura. Cola bastante larga, de abundante pillosidad y con una mancha de color negro en el extremo final. Alimentación: Roedores, aves, invertebrados.

Hábitat: Áreas de matorral y bosque.

Reproducción: En primavera, tiene hasta 5 crías.

Distribución: En todo Chile.



GATO MONTES (*Leopardus geoffroyi*)

Orden Carnívora.

Tamaño: 80 a 100 cm de largo, incluida la cola.

Características: Solitario, de hábitos crepusculares y nocturnos. Contextura robusta y piel manchada.

Alimentación: Pequeños roedores, liebres y aves.

Hábitat: Estepa, matorral y bosque adulto.

Reproducción: En agosto; el período de gestación es de 3 meses y tienen entre 2 y 3 crías.

Distribución: Regiones de La Araucanía, Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.

**PUMA** (*Puma concolor*)

Orden Carnívora.

Tamaño: 2,2 a 2,8 metros de largo, incluida la cola.

Características: Es el felino más grande de Chile. Los cachorros tienen la piel moteada; jóvenes y adultos, color café grisáceo. De hábitos solitarios y territoriales, es un veloz corredor de distancias cortas y buen trepador.

Alimentación: Especies nativas como chulengo (guanaco), cervatillo (huemul), aves de gran tamaño y especies introducidas como liebres, conejos, corderos, etc.

Hábitat: Estepa, matorral, bosque, incluyendo zonas de montaña (cordillera de la costa y cordillera de los Andes).

Reproducción: En primavera, con un período de gestación de 90 a 96 días. Tiene en promedio tres crías, aunque pueden ser hasta seis.
Distribución: En todo Chile.



CHINGUE (*Conepatus humboldtii*)

Orden Carnívora.

Tamaño: 50 a 60 cm, incluida la cola.

Características: De actividad vespertina y nocturna, vive en cuevas de dos a tres metros de profundidad. Expele una secreción fétida ante cualquier amenaza.

Alimentación: Insectos, larvas, lombrices, roedores, algunos frutos y raíces.

Hábitat: Áreas de estepa y matorral.

Reproducción: En primavera, con un periodo de gestación de 9 semanas. Tiene 3 a 7 crías.

Distribución: Desde la región de Araucanía a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

COIPO (*Myocastor coypus*)

Orden Rodentia.

Tamaño: 60 a 70 cm de largo.

Características: Es el roedor de mayor tamaño en Chile. Posee un pelaje muy tupido, de color café-acanelado. Pies y manos con membrana natatoria extendida en sus cuatro dedos. Cola redonda. Patas delanteras y cola tienen función direccional. Construye refugios subterráneos para protección y crianza, e islotes flotantes para alimentarse y descansar. Especie muy parecida al castor.

Alimentación: Plantas acuáticas y raíces.

Hábitat: Lagunas, lagos, ríos, esteros y humedales con presencia de vegetación.

Reproducción: La madurez sexual en las hembras es a los seis meses. Se reproducen en primavera y verano, con dos pariciones anuales. El período de gestación es de 127 a 138 días, tienen entre una y 13 crías.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



Ricardo Oyarzun

FAUNA: aves



Rodrigo Rodríguez

FLAMENCO CHILENO (*Phoenicopterus chilensis*)

Orden Ciconiformes. Familia Phoenicopteridae.

Tamaño: 1 metro de largo.

Características: De color rosa pálido, punta de alas negras, patas largas de color gris verdosas, iris amarillo pálido. Se agrupan en bandadas.

Alimentación: Pequeños crustáceos, moluscos e insectos acuáticos.

Hábitat: Lagunas salobres; escasamente, en cuerpos de agua dulce.

Nidificación: No nidifica en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

Distribución: Desde la región de Tarapacá a Magallanes y Antártica Chilena.



Rodrigo Rodríguez



CONAF

MARTÍN PESCADOR (*Ceryle torquata*)

Orden Coraciformes. Familia Alcedinidae.

Tamaño: 44 cm de largo.

Características: Cabeza grande azul grisácea, plumas de la corona con centro negro y algo levantadas. Plumas del dorso azul grisáceas, con finas rayas negras y moteadas de blanco. Garganta y lados del cuello blanco. Pecho, abdomen, alas y axilares rufo intenso. Cola negruzca con bandas transversales blancas. Pico negro puntiagudo. La hembra tiene el pecho gris azulado con un margen inferior blanco.

Alimentación: Peces, crustáceos, insectos terrestres y acuáticos.

Hábitat: Orillas arboladas de ríos, lagunas y lagos. Canales, ensenadas y fiordos.

Nidificación: En barrancas de tierra o arena; pone entre 3 y 5 huevos.

Distribución: Desde la Región de O'Higgins a Tierra del Fuego.



Patricia Salinas

ÑANDÚ (*Pterocnemia pennata*)

Orden Reiformes. Familia Rheidae.

Tamaño: 93 a 95 cm de largo.

Características: No vuela, pero es una excelente corredora; alcanzan velocidades de hasta 70 km/hr. Más pequeña que los avestruces de origen africano, es de color gris parduzco. Tiene el cuello cubierto de plumas y tres dedos en cada pata.

Alimentación: Granos y pastos.

Hábitat: Estepa arbustiva.

Nidificación: El macho tiene varias hembras, las cuales ponen en conjunto 30 a 50 huevos en un mismo nido. El macho incuba los huevos y cría a los polluelos (charitas) hasta los tres años. El huevo mide aproximadamente 12 x 8,5 cm.

Distribución: Regiones de Aysén y Magallanes y Antártica Chilena.



Pilar Higuera

CAIQUEN (*Chloephaga picta*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: Macho, 65 cm de largo; hembra 60 cm de largo.

Características: Es el ganso más grande de la región. El macho tiene la cabeza, cuello y vientre blancos barrados de negro, patas gris oscuro. La hembra tiene la cabeza grisácea o parda rojiza; el manto, pecho y abdomen de un tono café rojizo barrados de negro, patas amarillas.

Alimentación: Pastos e hierbas tiernas.

Hábitat: Pastizales, terrenos abiertos cercanos a cuerpos de agua, bordes de lagunas y lagos.

Nidificación: Desde mediados de octubre en adelante; pone entre 5 y 9 huevos.

Distribución: Desde la región de O'Higgins a Magallanes y Antártica Chilena.



Mauricio Ruiz

CANQUEN (*Chloephaga poliocephala*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 60 cm de largo.

Características: Cabeza y cuello gris, pecho rojizo, abdomen blanco adelante y atrás barrado (acanelado), rabadilla y cola negra. Pico negro, iris negro que presenta un anillo periocular blanco. Patas anaranjadas. De las cinco especies de gansos nativos que hay en Chile, es el único que habita en bosques.

Alimentación: Pastos e hierbas tiernas.

Hábitat: Zonas húmedas de áreas de matorral y bosques asociados a lugares húmedos. También en la estepa.

Nidificación: En el suelo, entre matorrales o árboles; pone entre 4 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de O'Higgins a Magallanes y Antártica Chilena.



Ricardo Oyarzun

CANQUÉN COLORADO (*Chloephaga rubidiceps*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 45 a 60 cm de largo.

Características: Especie endémica de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Se distingue por tener la cabeza y el cuello rojizo; su cuerpo es de color barrado en el pecho, los lados presentan líneas blancas y negras, y sus patas son amarillo anaranjado, cola negra. Suele confundirse con la hembra del caiquén.

Alimentación: Pastos y hierbas tiernas.

Hábitat: Estepa, vegas de pastos tiernos, riberas de ríos y bosques.

Nidificación: En el suelo, en lugares escondidos y árboles. Pone entre 5 y 7 huevos.

Distribución: Región de Magallanes y Antártica Chilena.

**CISNE COSCOROBA** (*Coscoroba coscoroba*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 100 a 110 cm de largo.

Características: De color blanco, puntas de las alas negras. Pico de color rojo y patas rosadas. Sumerge la cabeza bajo el agua para alimentarse. Emite un sonido similar a “cos-coroa”.

Alimentación: Invertebrados acuáticos, plantas palustres.

Hábitat: Pantanos, lagos y lagunas bajas con vegetación emergente.

Nidificación: En islotes dentro de lagunas pequeñas; pone entre 4 y 9 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CISNE DE CUELLO NEGRO (*Cygnus melancorypha*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 120 a 125 cm de largo.

Características: Completamente blanco, a excepción de la cabeza y el cuello, que son negros. Pico gris con notorias carúnculas nasales rojas. Patas de color rosado pálido.

Alimentación: Plantas acuáticas.

Hábitat: Lagos, lagunas y áreas costeras bajas y pantanosas, con vegetación emergente.

Nidificación: Entre arbustos, cerca de las lagunas; pone entre 4 y 7 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

PATO ANTEOJILLO (*Anas specularis*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 46 a 53 cm de largo.

Características: De cabeza, cuello y partes superiores color café oscuro. Posee una mancha ovalada de color blanco delante de los ojos, como "anteojillos" y otra en la garganta. Pico gris azulado. Patas anaranjadas.

Alimentación: Pequeños invertebrados, los cuales infiltra. También plantas acuáticas.

Hábitat: Ríos o lagunas con sitios apropiados para el descanso, como pequeñas playas o islotes, con bordes de bosque denso en zona cordillerana.

Nidificación: En el suelo, desde octubre en adelante; pone entre 4 y 7 huevos.

Distribución: Desde la región de Valparaíso a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

PATO JUARJUAL (*Lophonetta specularioides*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 55 cm de largo.

Características: Cuerpo grande, de figura alargada. Patas pardas grisáceas, pico gris azulado. Iris rojo, cabeza gris parda y cuello blanco. El lomo es pardo oscuro y su pecho y abdomen rojizo pálido. Alas pardo oscuro, con colores verde y lila metálico arriba, franja negra que termina en blanco.

Alimentación: Moluscos y crustáceos, e insectos acuáticos. Algunas algas o pastos tiernos.

Hábitat: Bahías costeras, lagunas y pantanos abiertos.

Nidificación: Entre pastos y matorrales, cerca de cuerpos de agua. Pone entre 5 y 9 huevos.

Distribución: En todo Chile.



Cortés de CEQUA

PATO REAL (*Anas sibilatrix*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 50 cm de largo.

Características: Pico, cola y patas negras. Cabeza y cuello negros, con brillos metálicos verdes y azules; frente y mejilla blancas, con lunar auricular blanco.

Alimentación: Plantas acuáticas y semillas.

Hábitat: Pantanos, lagos y lagunas con vegetación emergente, ríos anchos con ribera de pastos cortos. Nidificación: Desde octubre en adelante; pone entre 8 y 10 huevos.

Distribución: Desde la región Atacama hasta Magallanes y Antártica Chilena.



Francisco Gascoigne

QUETRU VOLADOR (*Tachyeres patachonicus*)

Orden Anseriformes. Familia Anatidae.

Tamaño: 70 cm de largo.

Características: Especie zambullidora. El macho es de color gris azulado, más claro en la cabeza y cuello, abdomen blanco, pico naranja con punta negra, patas amarillas. La hembra es similar, pero tiene la cabeza y el cuello más rojizo, y su pico es verdoso con punta negra.

Alimentación: Crustáceos, pequeños moluscos y plantas acuáticas.

Hábitat: Lagos y lagunas, tanto de agua dulce como salobres.

Nidificación: En pastos altos, de preferencia en islotes dentro de un cuerpo de agua; pone entre 5 y 10 huevos.

Distribución: Desde la región Bío Bío a Magallanes y Antártica Chilena.



Carla Hernández

BLANQUILLO (*Podiceps occipitalis*)

Orden Podicipediformes. Familia Podicipedidae.

Tamaño: 28 cm de largo.

Características: Solitario o en pequeñas bandadas. Excelente zambullidor, se alimenta mientras bucea. Cabeza gris ceniciento. Lados del pico y parte posterior alta del cuello gris oscuro. Nuca negra. Plumas auriculares largas y finas café amarillentas. Cuello, pecho y abdomen blancos. Flancos y lados del pecho negruzcos. Dorso gris oscuro. Barra blanca en el ala que se ve al batirla. Patas negras. Pico negro. Ojos rojos.

Alimentación: Plantas, pequeños peces y sus huevos, y crustáceos.

Hábitat: Lagos y lagunas someras, embalses, ríos tranquilos, ocasionalmente en el mar en bahías.

Nidificación: Sus nidos son flotantes hechos de totoras y anclados a plantas acuáticas. Pone entre 4 y 6 huevos de color blanco azulado.

Distribución: Desde la región de Atacama a Tierra del Fuego.



Rodrigo Molina

HUALA (*Podiceps major*)

Orden Podicipediformes. Familia Podicipedidae.

Tamaño: 78 cm de largo.

Características: Excelente nadadora y zambullidora. Especie estilizada de cabeza fina. Pico negro, iris rojo. Cara y garganta gris. Pecho y partes inferiores blancas, parte anterior del cuello y superior rojiza. Emite un característico grito lastimero.

Alimentación: Pantas, peces, insectos y otros invertebrados.

Hábitat: Humedales, ríos anchos, lagunas y lagos. Nidificación: Fabrica un nido flotante en el que pone entre 4 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

PIMPOLLO (*Rollandia rolland*)

Orden Podicipediformes. Familia Podicipedidae.

Tamaño: 26 cm de largo.

Características: Zambullidor. Iris rojo. Pico negro. Penacho auricular blanco con estrías negras. Patas gris oscuro.

Alimentación: Pequeños peces, alevines e invertebrados acuáticos.

Hábitat: Cuerpos de agua superficiales, preferentemente humedales.

Nidificación: Entre octubre y marzo. Su nido consiste en una plataforma de materiales vegetales construida entre pajonales; pone entre 3 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Arica y Paríacota, a Magallanes y Antártica Chilena.



Carla Hernández

PIDEN (*Pardirallus sanguinolentus*)

Orden Gruiformes. Familia Rallidae.

Tamaño: 35 a 40 cm de largo.

Características: Partes superiores café. Cabeza y partes inferiores grises. Pico largo de color verde y azulado en la base. Patas rojas.

Alimentación: Insectos.

Hábitat: Pantanos con juncos, áreas húmedas, riachuelos y riberas de lagos.

Nidificación: Entre la vegetación densa, cerca de riachuelos; pone entre 3 y 5 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Richard Pitter

TAGUA (*Fulica armillata*)

Orden Gruiformes. Familia Rallidae.

Tamaño: 50 cm de largo.

Características: Ave zambullidora. Presenta un escudo frontal amarillo en el frente de la cabeza, con una mancha roja oscura entre el pico y el escudo. La cabeza y el cuello son negros, y el resto gris oscuro. Patas amarillas oliváceas con franjas rojas.

Alimentación: Pastos de superficie o subacuáticos.

Hábitat: Ríos anchos, estuarios y lagunas con vegetación acuática.

Nidificación: En los bordes de las lagunas, en nidos flotantes; pone entre 4 y 8 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Carla Hernández

HUAIRAVO (*Nycticorax nycticorax*)

Orden Ciconiformes. Familia Ardeidae.

Tamaño: 57 cm de largo.

Características: Garza de hábitos nocturnos. Tiene el dorso y el lomo negro con un brillo verdoso metálico, sus partes inferiores van de color gris pálido o blanquecino. Iris rojos. El pico es largo y amarillo oscuro. Sus patas son cortas y tiene 2 o 3 plumas blancas que salen de la parte posterior de la cabeza. En estado juvenil es pardo grisáceo con líneas longitudinales blancas.

Alimentación: Peces, anfibios y algunos crustáceos.

Hábitat: En ríos, esteros, vegas y costas marinas con bosques.

Nidificación: Principalmente en árboles; también en totorales o acantilados.

Distribución: Desde la región de Arica y Parinacota a Magallanes y Antártica Chilena.



Francisco Gascogne

BANDURRIA (*Theristicus melanopis*)

Orden Ciconiformes. Familia Theresiornithidae.

Tamaño: 74 cm de largo.

Características: Pico largo y curvo de color negro. Cabeza, cuello y pecho de color amarillento pálido, partes inferiores negras. Tiene una vocalización fuerte y metálica, siendo fácil reconocerla y verla sobrevolando. Son gregarias, pueden anidar en colonias en un árbol.

Alimentación: Lombrices, insectos, invertebrados acuáticos.

Hábitat: Ambientes abiertos, terrenos pantanosos y otros lugares asociados a cuerpos de agua, bosques abiertos.

Nidificación: En árboles, acantilados; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Antofagasta a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

BECACINA (*Gallinago paraguaiae*)

Orden Charadriiformes. Familia Scolopacidae.

Tamaño: 30 cm de largo.

Características: Solitaria o en pareja, tímida. Se mimetiza con su entorno. Produce en el crepúsculo un sonido muy fuerte y característico causado por sus alas. Pico largo y recto de color verdoso oscuro.

Alimentación: Insectos, gusanos y lombrices.

Hábitat: Terrenos inundados tales como pantanos y turbas con pastos densos, riberas lodosas.

Nidificación: Entre el pasto de vegas o turbas; pone 2 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.

**CHORLO DE MAGALLANES (*Pluvianellus socialis*)**

Orden Charadriiformes. Familia Charadriidae.

Tamaño: 20 cm de largo.

Características: Partes superiores gris claro e inferiores blancas. Iris rosado. Cuello y pecho grisáceo con tinte pardusco. Pico negro, patas rosadas. Camina despacio y en línea recta. Se alimenta empujando y dando vueltas las piedrecillas y algas.

Alimentación: Pequeños crustáceos de los bordes de cuerpo de agua.

Hábitat: Riberas de lagos y lagunas salobres poco profundas.

Nidificación: En bordes de cuerpos de agua, depresiones de suelos arenosos; ponen entre 2 y 4 huevos.

Distribución: En Chile, solo en sector norte de isla Tierra del Fuego y sector noreste de nuestra región.



QUELTEHUE O TERO TERO (*Vanellus chilensis*)

Orden Charadriiformes. Familia Charadriidae.

Tamaño: 36 cm de largo.

Características: Vive solitario o en parejas. Son muy ruidosos, pues emiten gritos metálicos estridentes de advertencia. Tiene las patas rosadas, pico rosado con punta negra, iris rojo.

Alimentación: Invertebrados terrestres y acuáticos.

Hábitat: Vegas, praderas, siempre asociado a cuerpos de agua.

Nidificación: En el suelo, especialmente en vegas; pone entre 3 y 4 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

PILPILÉN O FIL-FIL AUSTRAL
(*Haematopus leucopodus*)

Orden Charadriiformes. Familia Haematopodidae.

Tamaño: 44 cm de largo.

Características: Pico largo y delgado de color anaranjado, ojos amarillos, patas rosado pálido. Cabeza, cuello, espalda, pecho y alas primarias negros; el resto blanco.

Alimentación: Pequeños crustáceos, otros invertebrados marinos.

Hábitat: Vegas húmedas, riberas pedregosas y fangosas.

Nidificación: En el suelo; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de los Lagos a Magallanes y Antártica Chilena.



Cristian Vazquez

PINGÜINO DE MAGALLANES (*Spheniscus magellanicus*)

Orden Sphenisciformes. Familia Spheniscidae.

Tamaño: 70 cm de largo.

Características: Posee pico negro con borde grisáceo. Notorio borde circular blanco, que nace en la frente y se junta en la garganta. Cabeza, collar y partes superiores de color negro. De frente, se observan dos bordes pectorales negros y el resto de sus partes inferiores blancas con línea negra que corre paralela al negro del dorso.

Alimentación: Peces.

Hábitat: Zonas costeras.

Nidificación: En cuevas que cavan ellos mismos; ponen generalmente dos huevos.

Distribución: Desde la región de Valparaíso a Magallanes y Antártica Chilena.



CÓNDOR (*Vultur gryphus*)

Orden Falconiformes. Familia Cathartidae.

Tamaño: 120 cm de largo. Envergadura alar, 3 metros.

Características: Observan desde el aire a gran altura en busca de animales muertos. El macho posee una cresta carnosa de color rojizo oscuro. La hembra tiene iris rojo. Ambos tienen un collar blanco alrededor del cuello en la cabeza.

Alimentación: Animales muertos.

Hábitat: Ambientes montañosos y esteparios.

Nidificación: En riscos, cuevas en precipicios de difícil acceso; ponen solo un huevo.

Distribución: En todo Chile.



ÁGUILA (*Geranoaetus melanoleucus*)

Orden Falconiformes. Familia Accipitridae.

Tamaño: 64 a 74 cm de largo.

Características: Emite fuertes chillidos en vuelo. Tiene forma triangular en vuelo. Es frecuente verla planeando o acechando a sus presas.

Alimentación: Pequeños animales y animales muertos,

Hábitat: Campos abiertos semiáridos con formaciones rocosas y árboles dispersos, parques.

Nidificación: En bordes de rocas inaccesibles y copas de grandes árboles.
Distribución: En todo Chile.



CONAF



Rodrigo Rodríguez

PEUQUITO (*Accipiter bicolor*)

Orden Falconiformes. Familia Accipitridae.

Tamaño: 37 a 42 cm de largo.

Características: Pecho y abdomen gris ceniza con bandas anchas oscuras transversales. Cola gris oscura con 5 o 6 bandas transversales más oscuras. Patas amarillas verdosas, ojos amarillos. La especie inmadura (juvenil) es de color café en las partes superiores y blanco en las inferiores.

Alimentación: Aves menores y roedores.

Hábitat: Claros de bosques, áreas adyacentes de matorral.

Nidificación: En árboles y matorrales altos; pone entre uno y 4 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

TIUQUE (*Milvago chimango*)

Orden Falconiformes. Familia Falconidae.

Tamaño: 37 a 42 cm de largo.

Características: Partes superiores oscuras, cola y alas crema, partes inferiores café acanelado claro con barras más oscuras en la zona del pecho y abdomen. La hembra tiene patas amarillas y el macho gris claro.

Alimentación: Pequeños vertebrados y animales muertos.

Hábitat: Bosques abiertos, matorral, pantanos y campos cultivados.

Nidificación: En la copa de los árboles; pone 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Pedro Ferrada

TRARO O CARANCHO (*Polyborus plancus*)

Orden Falconiformes. Familia Falconidae.

Tamaño: 55 a 60 cm de largo.

Características: Corona con moño negro en la cabeza. Mejillas, garganta y cuello cremoso, desde allí pardo oscuro con barras transversales de color crema en el manto y el pecho, a negro. Patas amarillas, pico ancho amarillas hasta la mitad, el resto azul pardo. Se ven en pares o grupos.

Alimentación: Pequeños animales y animales muertos.

Hábitat: Bosques, matorral, pantanos y estepa.

Nidificación: En árboles; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: En todo Chile.



Jaime Rodríguez

CHUNCHO (*Glaucidium nanum*)

Orden Strigiformes. Familia Strigidae.

Tamaño: 17 a 21 cm de largo.

Características: Es el más pequeños de los rapaces nocturnos. Cuerpo acanelado con lunares blanquecinos alargados. Iris, pico y patas amarillas.

Alimentación: Roedores y aves pequeñas o medianas.

Hábitat: Bosques y parques.

Nidificación: En huecos de árboles formados naturalmente, o que fueron abandonados por carpinteros; pone entre 3 y 5 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Melina Barredo

NUCO (*Asio flammeus*)

Orden Strigiformes. Familia Strigidae.

Tamaño: Hasta 40 cm.

Características: Cabeza plana. Pico amarillo plano. Plumaje café grisáceo con el vientre gris claro moteado de oscuro. Anillo negro alrededor de los ojos. Iris amarillo. Posee unos cortos penachos de plumas que asemejan orejas. De hábitos más diurnos que crepusculares.

Alimentación: Roedores y pequeñas aves.

Hábitat: Terrenos abiertos y bajos con pastizales altos, vegas, pantanos y áreas inundadas con vegetación en orillas.

Nidificación: En el suelo; pone entre 5 y 7 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama hasta Magallanes y Antártica Chilena.



Richard Rittler

TUCÚQUERE (*Bubo virginianus*)

Orden Strigiformes. Familia Strigidae.

Tamaño: 49 cm de largo.

Características: Es el búho más grande de Chile, de hábitos nocturnos. Posee penachos en la cabeza que parecen orejas, cabeza grande, pico corto negro, tiene un collar blanco alrededor del cuello, iris amarillo. Cazan en vuelo.

Alimentación: Roedores; también pequeñas aves.

Hábitat: Bosque, estepa y pastizal matorral con áreas rocosas.

Nidificación: En huecos de árboles, cuevas o rocas, también en el suelo. Pone entre 2 y 4 huevos

Distribución: En todo Chile.



Francisco Escobedo

CACHAÑA (*Enicognathus ferrugineus*)

Orden Psittaciformes. Familia Psittacidae.

Tamaño: 36 cm de largo.

Características: Es el loro más austral del mundo. De coloración verde, en alas es más verde azulado. Cola y frente rojiza. Tiene un pico ganchudo, ancho y corto. Abdomen con una mancha oscura rojiza. Es gregario, forman bandadas numerosas y bulliciosas.

Alimentación: Frutos, brotes tiernos, semillas, pastos.

Hábitat: Zonas boscosas y áreas abiertas de pastizales y matorrales con abundante alimento.

Nidificación: En troncos huecos; pone entre 4 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Valparaíso a Magallanes y Antártica Chilena.



Rodrigo Molina

CARPINTERO NEGRO
(*Campephilus magellanicus*)

Orden Piciformes. Familia Picidae.

Tamaño: 40 a 45 cm de largo.

Características: El macho tiene la cabeza roja y la hembra es negra, pero alrededor de la base del pico tiene un anillo de plumas de color rojo. Posee una cresta de plumas sobre la cabeza. Golpetea los troncos, delatando su presencia. Tiene una lengua larga que usa para capturar su alimento de las galerías que dejan las larvas en los árboles. Su lengua es 4 veces el largo de su pico.

Alimentación: Insectos, larvas que extrae de los árboles.

Hábitat: Bosques maduros de *Nothofagus*.

Nidificación: En huecos de árboles; pone entre 3 y 5 huevos.

Distribución: Desde la región del Maule a Magallanes y Antártica Chilena.



PITIO (*Colaptes pitius*)

Orden Piciformes. Familia Picidae.

Tamaño: 30 a 34 cm de largo.


Características: De coloración café amarillento, con un barrado blanquecino. Cabeza café oscuro. Cola negra que termina en dos puntas. Pico negro y patas grises, iris amarillo. Tiene un vuelo planeado a intervalos, acompañado de su característico grito "pit-tiu, pit-tiu". Busca su alimento en árboles y troncos viejos, pero también es posible verlo en el suelo.

Alimentación: Gusanos, larvas e insectos; también bayas y semillas silvestres.

Hábitat: Parques, bosques achaparrados y abiertos cerca de ríos.

Nidificación: En huecos de troncos de árboles que el mismo fabrica; pone entre 4 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CHURRETE ACANELADO (*Cinclodes fuscus*)

Orden Passeriformes. Familia Furnariidae.

Tamaño: 15 cm de largo.

Características: Dorso pardo, garganta y cuello blanquecinos, mancha café amarillenta a los lados del cuello, ceja blanca. Pecho blanquecino a pardo pálido hacia abajo. Alas con banda acanelada. Pico negro y patas gris oscuras. Ave muy activa y confiada ante la presencia humana.

Alimentación: Invertebrados terrestres.

Hábitat: Riberas de cuerpos de agua, terrenos húmedos.

Nidificación: En grietas o murallas de piedra en laderas de cerros; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Jaime Rodríguez

Marcos Aguilar

RAYADITO (*Aphrastura spinicauda*)

Orden Passeriformes. Familia Furnariidae.

Tamaño: 14 cm de largo.

Características: Partes inferiores de color ocre intenso; la garganta a veces blanquecina. Son muy móviles y curiosos. Usualmente con la cola erguida.

Alimentación: Insectos, larvas.

Hábitat: Bosques de Nothofagus y matorrales cercanos.

Nidificación: En cavidades de árboles, formadas naturalmente o abandonadas por carpinteros o comesebos; pone entre 2 y 5 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



Guillermo Neumann

COLEGIAL (*Lessonia rufa*)

Orden Passeriformes. Familia Tyrannidae.

Tamaño: 11 a 12 cm de largo.

Características: La hembra es parda con el manto castaño claro, el macho es negro con el manto castaño. Suelen volar cruzándose en los caminos.

Alimentación: Insectos.

Hábitat: Estepa, riberas y pantanos con vegetación corta.

Nidificación: Bajo pequeños matorrales; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Marcelo Aguirre

DIUCÓN (*Xolmis pyrope*)

Orden Passeriformes. Familia Tyrannidae.

Tamaño: 19 a 21 cm de largo.

Características: Cuerpo gris, iris rojo. Pico y patas negras. Tiene la costumbre de posarse en la punta de las ramas altas de arbustos y matorrales. Se caracteriza por su vuelo en “sube y baja” con aleteos intermitentes.

Alimentación: Insectos, larvas y frutos silvestres.

Hábitat: Matorral, parques y bosques abiertos.

Nidificación: En arbustos y árboles achaparrados; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



Cortés de CEQUA

GOLONDRINA CHILENA (*Tachycineta meyeri*)

Orden Passeriformes. Familia Hirundinidae.

Tamaño: 13 cm de largo.

Características: Superficie dorsal azul oscura metálica. Mancha blanca desde garganta a alas de la cola. Patas negras. Sobrevuela a ras del agua cuando busca alimento o beben agua.

Alimentación: Insectos.

Hábitat: Todo tipo de ambientes, de preferencia cerca de asentamientos humanos y bosques.

Nidificación: En cavidades de árboles, riscos y techos; pone entre 4 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.

**CHERCÁN (*Troglodytes aedon*)**

Orden Passeriformes. Familia Troglodytidae.

Tamaño: 12 cm de largo.

Características: De coloración café, sus alas y cola café amarillento. Pico fino. Al moverse siempre está con la cola erguida. Extremadamente activo y bullicioso.

Alimentación: Insectos.

Hábitat: Matorrales, bosques abiertos, áreas húmedas y áridas.

Nidificación: Entre matorrales, cuevas y grietas de troncos; pone entre 4 y 7 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



CHINCOL (*Zonotrichia capensis*)

Orden Passeriformes. Familia Emberizidae.

Tamaño: 14 a 16 cm de largo.

Características: El macho posee un penacho en la cabeza. Tiene un anillo café rufo alrededor del cuello. Su canto es dulce y melodioso.

Alimentación: Insectos y granos.

Hábitat: Todo tipo de ambientes.

Nidificación: En arbustos, árboles achaparrados y entre el pasto en el suelo; pone entre 3 y 5 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.

**LOICA** (*Sturnella loyca*)

Orden Passeriformes. Familia Emberizidae.

Tamaño: 22 a 25 cm de largo.

Características: La mayoría de su cuerpo es café con estrías negruzcas. En la cabeza tiene una especie de banda blanquecina. El macho posee la garganta y vientre de color rojo, la hembra es rojo más pálido y de menor extensión. Pico pardo oscuro puntiagudo. Patas largas.

Alimentación: Insectos, frutos y semillas.

Hábitat: Pastizales, matorral y bosque abierto.

Nidificación: En el suelo; pone entre 2 y 4 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



TORDO (*Cureaus cureaus*)

Orden Passeriformes. Familia Emberizidae.

Tamaño: 24 a 28 cm de largo.

Características: Patas y pico negro; cuerpo negro, a excepción de sus alas que son marrón oscuro. Se ven frecuentemente en bandadas. Muy bulliciosa y notoria.

Alimentación: Insectos y otros invertebrados terrestres.

Hábitat: Bosques abiertos, matorrales, laderas húmedas.

Nidificación: En matorrales densos; pone entre 3 y 6 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

COMETOCINO PATAGÓNICO
(*Phrygilus patagonicus*)

Orden Passeriformes. Familia Fringillidae.

Tamaño: 14 a 16 cm de largo.

Características: Los machos tienen un plumaje más llamativo que las hembras; cabeza gris azulado y penacho amarillo. Pico claro.

Alimentación: Pequeñas semillas y pequeños insectos.

Hábitat: Bosques de *Nothofagus*; áreas transicionales entre bosque, matorral a pastizal.

Nidificación: En arbustos, árboles bajos o entre rocas; pone entre 2 y 4 huevos.

Distribución: Desde la región de Coquimbo a Magallanes y Antártica Chilena.



CONAF

ZORZAL (*Turdus falcklandii*)

Orden Passeriformes. Familia Muscicapidae.

Tamaño: 23 a 26 cm de largo.

Características: Partes superiores gris oscuro con tinte oliváceo. Cabeza negra a café claro. Garganta parda blanquecina con estrías longitudinales negras. Pecho y abdomen pardos blanquecinos amarillento. Alas y cola negruzcas. Pico y patas amarillas. Ojos café con círculo periocular amarillos. Imita a otras aves, es confiada ante la presencia humada.

Alimentación: Pastos, frutos, gusanos, artrópodos, caracoles.

Hábitat: Matorral, bosques y asentamientos humanos.

Nidificación: En árboles y arbustos; pone entre 2 y 3 huevos.

Distribución: Desde la región de Atacama a Magallanes y Antártica Chilena.

**Literatura consultada**

- Brown V., M. Saavedra, Jara M. y G. Guíñez. (2002). Guía de aves de la Reserva Nacional Malleco y Parque Nacional Tolhuaca IX Región, Chile. Primera edición.
- Couve E. y C. Vidal (1999). Dónde observar aves en el Parque Nacional Torres del Paine. Editorial Fantástico Sur- Birding & Nature Tours.
- Garay G.; O. Guineo (2003). Fauna, flora y montaña de Torres del Paine. Editorial La Prensa Austral.
- SAG. (2001) Manual de terreno. Identificación de especies en pastizales de la XII Región.
- Sitio web Aves de Chile. www.avesdechile.cl; <http://avesdetalcahuano.blogspot.com/>
- Sitio web Flora de Chile. www.chileflora.com ; www.chilebosque.cl ; www.florachilena.cl

Corporación Nacional Forestal CONAF

Departamento de Áreas Silvestres Protegidas
Región de Magallanes y Antártica Chilena

Punta Arenas
Av. Bulnes 0309
Fono: (56-61) 223 85 81

Puerto Natales
Manuel Baquedano 847
Fono: (56-61) 241 14 38

WWW.CONAF.CL

Editores

Carla Hernandez
Alejandra Silva

Revisión

Alejandra Zúñiga

Diseño

Mauricio Bonacic

